

短 報

ヒトエスイフヨウに就いて (山崎 敬)

Takashi YAMAZAKI: On a Form of *Hibiscus mutabilis* L.

フヨウ *Hibiscus mutabilis* の八重咲品にスイフヨウ cv. *Versicolor* がある。これは花が八重咲であるだけでなく、朝は白いが夕方には赤くなる。それで酔芙蓉と呼ばれている。江戸時代からよく知られた品種で種々の本に出てくるが、本来は中国原産で、1197年(南宗時代)に李迪の描いた芙蓉は白花のものと、赤みを帯たものとの八重咲品が二個体描かれ、酔芙蓉でないかと考えられていて、国宝として東京国立博物館に保存されている。ところが酔芙蓉には一重のものがあることはあまり知られていないし、文献にもでてこないが稀に栽培されている。かつて横浜の園芸家故鈴木吉五郎氏のところにあったと言う。八重咲品のような重苦しさがなく、清楚な美しいものである。その美しさを聞いた武蔵野市の故世戸東治郎氏は、それが容易には手に入らないので自分で作ってみようと考えた。今から

20年前のことである。赤花の芙蓉と白花の芙蓉とを交配して、一重の酔芙蓉を作りだした。それは従来の一重の酔芙蓉と区別のない見事なものである。朝は純白であるが、10時頃には少し赤味が入り、午後2時頃には赤くなる(Fig.1)。世戸氏からいただいたものが私の所にあるが、5mほどの丈になり、毎年美しい花を咲かせている。種から増えたものも多くは一重の酔芙蓉となる。私の所で増やしたものが、小石川植物園の正門から入って右に植えられている。最近、八重の酔芙蓉と共に一重のものも、花屋から売りに出されているので、これから広まることと思う。ただ来歴をたどらないと、従来からのものか、世戸氏由来のものかはわからない。一重の酔芙蓉は今までの文献にも出てこないし、正しく認識されていない。昨年9月30日に書かれた朝日新聞での芙蓉の解説では、これを白

Fig. 1. ヒトエスイフヨウ *Hibiscus mutabilis* L. cv. *Hitoesuihuyō*.

a: Photo. at 10am. b. The same flower at 2pm.

花芙蓉の一種として扱うなど誤解されているので、来歴を明らかにし、ヒトエスイフヨウ cv. *Hitoesuihuyō* (Corolla simple, then pink) と

呼ぶことにしたい。白花芙蓉と普通の芙蓉との間にできた一つの品種である。

(東京都中野区 [redacted])

ムラサキイワベンケイと *Orostachys aliciae* (ベンケイソウ科) の種内分類群の学名新組合せ (大場秀章)。

Hideaki OHBA: New Intraspecific Names in *Rhodiola integrifolia* Raf. and *Orostachys aliciae* (Raym.-Hamet) H. Ohba (Crassulaceae).

In preparation of *Synopsis Plantarum Succulentum* by International Organization for Succulent Plant Study, it becomes necessary to propose the following three infraspecific names in *Rhodiola integrifolia* and one in *Orostachys aliciae*.

1) *Rhodiola integrifolia* Raf., Atlantic J. and Friend of Knowledge **1**: 146 (1832).

Subsp. **leedyi** (Rosend. & J. W. Moore) H. Ohba, comb. nov.

Sedum rosea (L.) Scop. var. *leedyi* Rosend. & J. W. Moore in *Rhodora* **49**: 198 (1947).

Sedum integrifolium (Raf.) A. Nelson subsp. *leedyi* (Rosend. & J. W. Moore) R. T. Clausen, *Sedum of N Amer.*: 502 (1975).

Tolmacheva integrifolia (Raf.) A. Löve & D. Löve subsp. *leedyi* (Rosend. & J. W. Moore) A. Löve & D. Löve in *Taxon* **34**: 163 (1985).

Type: N America. Minnesota: Olmstead Co., North Branch of Root River opposite Herman McDaniel farm about 5km south of Simpson. John L. Leedy on July 12, 1942 (MIN).

Subsp. **neomexicana** (Britton) H. Ohba, comb. nov.

Rhodiola neomexicana Britton in Bull. New York Bot. Gard. **3**(9): 38 (1903).

Sedum rosea (L.) Scop. var. *neomexicanum* (Britton) A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **18a**: 440 (1930).

Sedum integrifolium (Raf.) A. Nelson subsp. *neomexicanum* (Britton) R. T. Clausen, *Sedum of N Amer.*: 509 (1975).

Tolmacheva integrifolia (Raf.) A. Löve & D. Löve subsp. *neomexicana* (Britton) A. Löve & D. Löve in *Taxon* **34**: 163 (1985).

Type: N America. New Mexico: Lincoln Co., White Mountain Peak, alt. 3500m. E. O. Wooton

on Aug. 1, 1930 (NY).

Subsp. **procera** (R. T. Clausen) H. Ohba, comb. nov.

Sedum integrifolium (Raf.) A. Nelson subsp. *procera* R. T. Clausen, *Sedum of N Amer.*: 506 (1975).

Tolmacheva integrifolia (Raf.) A. Löve & D. Löve subsp. *procera* (R. T. Clausen) A. Löve & D. Löve in *Taxon* **34**: 164 (1985).

Type: N America. Colorado: San Juan Co., Southern Rocky Mountains, N of Silverton, Bonita Peak, alt. 3932m. R. T. Clausen No. 62-69 (BH [CU]).

2) *Orostachys aliciae* (Raym.-Hamet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, Bot. **12**: 160 (1978).

Var. **komarovii** (Raym.-Hamet) H. Ohba, comb. nov.

Sedum aliciae Raym.-Hamet var. *komarovii* Raym.-Hamet in J. Russ. Bot. 1912: 175 (1912).

Kungia aliciae (Raym.-Hamet) K. T. Fu var. *komarovii* (Raym.-Hamet) K. T. Fu in J. N.-W. Teach. Coll. (Nat. Sci.) Special Issue **1**: 5 (1988).

Type: China. Szechuan. Potanin s. n. in 1893 (LE).

国際多肉植物研究機構が編集出版を企画している *Synopsis Plantarum Succulentum* を執筆中に未発表のムラサキイワベンケイの3亜種名と *Orostachys aliciae* の1変種名を用いる必要が生じたために、ここにそれらを提唱した。前者の3亜種はいずれも北米産のもので、亜種の分布、区別点は R. T. Clausen (1975) *Sedum of North America* に詳しく解説されている。後者は中国四川省に特産する。

(東京大学総合研究博物館)